


# CONFLICTO ISQUIOFEMORAL



## VIDEOTÉCNICA

- Es una de las causas de dolor extracapsular, atípico, en la región glútea profunda (aunque puede presentarse a veces como dolor inguinal)
- Inicialmente (1977) fue descrito como una de las causas de prótesis de cadera dolorosa, y posteriormente como causa de dolor en pacientes sin antecedente quirúrgico ni traumático (2008)
- El diagnóstico se sospecha si el espacio isquiofemoral es  $<15$  mm y el espacio del cuadrado femoral es  $<10$  mm, aunque se requiere la presencia de síntomas combinada con edema en el cuadrado femoral en la RMN
- Hay que recordar que la medición del espacio estáticamente en la RMN puede no reflejar lo que ocurre dinámicamente durante actividades laborales o deportivas

Hernando MF, Cerezal L, Pérez-Carro L, Canga A, González RP. Evaluation and management of ischiofemoral impingement: a pathophysiologic, radiologic, and therapeutic approach to a complex diagnosis. *Skeletal Radiol.* 2016

Atkins PR, Fiorentino NM, Aoki SK, et al. In vivo measurements of the ischiofemoral space in recreationally active participants during dynamic activities: a high-speed dual fluoroscopy study. *Am J Sports Med.* 2017







Posicionamiento convencional  
para artroscopia de cadera

[www.arriaza.es](http://www.arriaza.es)



**ISAKOS Teaching Center**  
**ESSKA Teaching Center**  
**AEA Centro de Formación**  
**SETRADE Centro de Formación**